



Възможни ваксинационни схеми при ваксините срещу COVID-19

Възрастови групи	Основна имунизация				Първа бустерна доза		Втора бустерна доза	
	Първа доза	Втора доза	Вид ваксина	Интервал между двете дози (в седмици)	Първи бустер	Интервал между завършен ваксинационен курс и бустер	Втори бустер	Интервал между първи и втори бустер
5-11 г., вкл.	Comirnaty	Comirnaty	иРНК	≥ 3	Не се поставя	-	Не се поставя	-
	Spikevax	Spikevax	иРНК	≥ 4	Не се поставя			
6-11 г., вкл.	Spikevax	Spikevax	иРНК	≥ 4	Не се поставя	-	Не се поставя	-
	Comirnaty	Comirnaty	иРНК	≥ 3	Comirnaty		Най-малко 3 м.	
12-17 г., вкл.	Comirnaty	Comirnaty	иРНК	≥ 3	Comirnaty	Най-малко 3 м.	Не се поставя	-
	Spikevax	Spikevax	иРНК	≥ 4	-	-	Не се поставя	-
≥ 18 г.	Comirnaty	Comirnaty	иРНК	≥ 3	Comirnaty Spikevax	Най-малко 3 м.	Comirnaty Spikevax	Най-малко 4 м.
	Spikevax	Spikevax	иРНК	≥ 4	Spikevax Comirnaty	Най-малко 3 м.	Comirnaty Spikevax	Най-малко 4 м.
	Vaxzevria	Vaxzevria	векторна	4-12	Comirnaty	Най-малко 3 м.	Comirnaty Spikevax	Най-малко 4 м.
	Vaxzevria	Vaxzevria	векторна	4-12	Spikevax	Най-малко 3 м.	Comirnaty Spikevax	Най-малко 4 м.
	JCOVDEN	-	векторна	-	Comirnaty	Най-малко 3 м.	Comirnaty Spikevax	Най-малко 4 м.
	JCOVDEN	-	векторна	-	JCOVDEN	Най-малко 2 м.	Comirnaty Spikevax	Най-малко 4 м.
	JCOVDEN	-	векторна	-	Spikevax	Най-малко 3 м.	Comirnaty Spikevax	Най-малко 4 м.
	Comirnaty	Comirnaty	иРНК	≥ 3	JCOVDEN	Най-малко 3 м.	Comirnaty Spikevax	Най-малко 4 м.
	Spikevax	Spikevax	иРНК	≥ 4	JCOVDEN	Най-малко 3 м.	Comirnaty Spikevax	Най-малко 4 м.
	Vaxzevria	Comirnaty	Схема на хетероложна ваксинация	≥ 12	Comirnaty	Най-малко 3 м.	Comirnaty Spikevax	Най-малко 4 м.

** На лица, които са тежко имунокомпрометирани (вкл. деца над 5 г.), трета (подсилваща) доза иРНК ваксина може да се приложи най-малко 28 дни след втората доза, по преценка на лекар.

*** Таблицата е изготвена съгласно препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката и кратките характеристики на посочените ваксини срещу COVID-19.